

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA REPUBLIKE HRVATSKE
HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO

MATEMATIKA

Zadaci za općinsko – gradsko natjecanje učenika
osnovnih škola Republike Hrvatske
1. ožujka 1997. godine

6. razred

1. Umnožak tri uzastopna parna prirodna broja je 17472. Koji su to brojevi?
2. Ako od nekog broja oduzmemo $\frac{2}{5}$ tog broja, a zatim od dobivenog ostatka oduzmemo $\frac{4}{9}$ dobivenog ostatka i 195, preostali će broj biti za 124 veći od $\frac{2}{17}$ početnog broja. Odredi početni broj!
3. Za četiri broja znamo da je zbroj prvog i drugog broja 11, zbroj drugog i trećeg broja je 2.3, a zbroj trećeg i četvrtog broja je 8.4. Kolika je polovina zbroja prvog i četvrtog broja?
4. Dan je trokut ABC , pri čemu je $\angle CAB - \angle CBA = 30^\circ$. Koliki je kut što ga zatvaraju visina iz vrha C na stranicu \overline{AB} i simetrala vanjskog kuta pri vrhu C ?
5. Dana su dva usporedna pravca a i b i pravac c koji siječe pravac a u točki A , te pravac b u točki B , pri čemu pravac c nije okomit na pravac a . Na pravcu b lijevo od točke B odabrana je točka D , a desno od točke B točka E . Simetrala kuta $\angle ABD$ sijeće pravac a u točki M , a simetrala kuta $\angle ABE$ sijeće pravac a u točki N .
Dokaži da je:
 - (a) trokut MBN pravokutan,
 - (b) $|AM| = |AN|$.

RJEŠENJA ZA 6. RAZRED

OVDJE JE DAN JEDAN NAČIN RJEŠAVANJA ZADATAKA. UKOLIKO UČENIK IMA DRUGAČIJI POSTUPAK RJEŠAVANJA ČLAN KOMISIJE JE DUŽAN I TAJ POSTUPAK BODOVATI I OCIJENITI NA ODGOVARAJUĆI NAČIN.

1. Kako je $20 \cdot 20 \cdot 20 = 8000$, a $30 \cdot 30 \cdot 30 = 27000$, zaključujemo da su traženi brojevi veći od 20, a manji od 30.

Od tri uzastopna parna broja jedan je sigurno djeljiv sa 4, a jedan sa 3, pa je umnožak tih brojeva djeljiv sa $2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 3$, tj. sa 48.

Sada lako zadani umnožak rastavimo na faktore. Naime, zbog $17472 : 48 = 364$, te $364 : 4 = 91$ i $91 = 7 \cdot 13$, vrijedi $17472 = 48 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 13$.

Zbog faktora 13 i 7, nužno je jedan broj 26, a drugi 28.

Traženi su brojevi 24, 26 i 28.

.....UKUPNO 10 bodova

2. Ako od broja x oduzmem $\frac{3}{5}$ tog broja ostane $\frac{3}{5}$ tog broja, tj. $\frac{3}{5}x$.

Od tog rezultata oduzimamo $\frac{4}{9}$ dobivenog ostatka i 195, tj. $\frac{3}{5}x - \frac{4}{9}(\frac{3}{5}x) - 195$, što je jednako: $\frac{1}{3}x - 195$.

Sada vrijedi $\frac{1}{3}x - 195 = \frac{7}{17}x + 124$.

Početni broj je 1479.

.....UKUPNO 10 bodova

3. Neka je a prvi broj, b drugi, c treći i d četvrti broj. Tada vrijede ove jednakosti: $a + b = 11$, $b + c = 2.3$, $c + d = 8.4$.


Zbrajanjem ovih jednakosti dobivamo redom $a + 2b + 2c + d = 21.7$, odnosno $a + 2(b + c) + d = 21.7$.

$a + 2 \cdot 2.3 + d = 21.7$, $a + 4.6 + d = 21.7$, tj. $a + d = 17.1$.

Zato je polovina zbroja prvog i četvrtog broja 8.55.

.....UKUPNO 10 bodova

4. Skica



.....2 boda

Neka je $\angle CAB = \alpha$, $\angle CBA = \beta$, $\angle ACB = \gamma$, kut γ vanjski kut kod vrha C , točka D može se viseći iz vrha C na stranicu AB , točka E presjek simetrale vanjskog kuta kod vrha C i pravca AB i neka je $\angle ECD = x$. Tada je $\alpha - \beta = 30^\circ$ ili $\alpha = \beta + 30^\circ$, $\angle ACD = 90^\circ - \alpha$, jer je trokut ACD pravokutan, $\angle ACE = \frac{\gamma}{2}$.

.....1 bod

Dalje vrijede redom ove jednakosti: $x = \frac{\gamma}{2} + 90^\circ - \alpha$, $x = \frac{\alpha + \beta}{2} + 90^\circ - \alpha$, $x = \frac{\alpha + \beta}{2} + 90^\circ - (\beta + 30^\circ)$,

$x = \frac{\alpha + \beta}{2} + 90^\circ - \beta - 30^\circ$, $x = \frac{\alpha + \beta}{2} + 60^\circ - \beta$, $x = \frac{\alpha + \beta + 120^\circ - 2\beta}{2}$, $x = \frac{\alpha - \beta + 120^\circ}{2}$, $x = \frac{10^\circ + 120^\circ}{2}$.

.....5 bodova


Kut $\angle ECD$ je 75° .

.....2 boda

Ukoliko je učenik dobio 105° taj rezultat je također ispravan i bodoće se sa 2 boda.

.....UKUPNO 10 bodova

5. Skica



1 bod

- (a) Neka je $\angle ABD = \alpha$ i $\angle LABE = \beta$. Tada je $\angle LABM = \frac{\alpha}{2}$ i $\angle LABN = \frac{\beta}{2}$. Kako je $\alpha + \beta = 180^\circ$, jer su to dva sukuta, slijedi da je $\frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} = 90^\circ$, tj. $\angle LMBN = 90^\circ$, pa je trokut MBN pravokutan.

3 boda

- (b) Očito je $\angle LDBM = \angle LAMB$, jer su to kutovi uz presječnicu, a zbog $\angle LDBM = \angle LABM$ (po definiciji simetrale), slijedi da je $\angle LAMB = \angle LABM$, a to znači da je trokut AMB jednakočrstan, pa je $|AM| = |AB|$.
- Kako je $\angle LEBN = \angle LANB$ i $\angle LEBN = \angle LABN$, slijedi da je $\angle LANB = \angle LABN$, pa je $|AB| = |AN|$.
- Iz $|AM| = |AB|$ i $|AB| = |AN|$ slijedi da je $|AM| = |AN|$.

2 boda

2 boda

2 boda

UKUPNO 10 bodova